

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ

В. БОГОМОЛОВ, канд. с.-х. наук, ФГУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория»

А. САФОНОВ, канд. с.-х. наук, ООО «ИП «Апекс плюс»

А. ГОЛУБЕВ, начальник департамента по производству ОАО «Бройлер Рязани»

Многолетние производственные испытания кормовой добавки **Клим** при выращивании бройлеров в различных климатических зонах показали ее высокую эффективность. При использовании этой добавки в кормлении птицы у нее нормализуется микрофлора желудочно-кишечного тракта, повышается продуктивность и улучшается сохранность.

Кормовая добавка **Клим** в небольших количествах (300 г на 1 т комбикорма) используется в качестве подкислителя, а в сочетании с кокцидиостатиками — как средство, повышающее эффективность профилактики кокцидиоза. **Клим** обладает свойствами антидота, антиоксиданта, иммуномодулятора, регулятора обменных процессов, ингибитора расщепления аминокислот, стимулятора роста.

Этим препаратом заинтересовались ученые ВНИТИП. Они провели под руководством профессора Т.М. Околевой научный опыт в экспериментальном хозяйстве института на цыплятах-бройлерах кросса Кобб Авиан 48 и получили положительные результаты (см. статью в ж. «Комбикорма» №2—2011).

С учетом рекомендаций ученых ВНИТИП мы решили апробировать действие препарата **Клим** на птице при ее содержании на полу и в клетках, для чего в опытно-экспериментальном цехе ОАО «Бройлер Рязани» провели исследования на цыплятах-бройлерах кросса Смена 7. Для опыта цыплят подбирали по принципу аналогов. Продолжительность их выращивания составила 40 дней. Условия содержания и кормления бройлеров во всех группах были одинаковыми, за исключением состава рациона. В комбикорма для цыплят опытных групп вводили препарат **Клим** из расчета 300 г/т, контрольной группы — по 50 г на 1 т в чистом виде лимонную и янтарную кислоты.

Из данных таблицы 1 видно, что при содержании цыплят на полу практически все основные производственные показатели в опытной группе, где применяли добавку **Клим**, превышали контроль: среднесуточный прирост живой массы бройлера — на 4,8 г, средняя живая масса — на 233 г, а такой комплексный показатель, как европейский бройлерный индекс (EBI), — на 37 ед.; конверсия корма лучше на 0,14. На выращивание цыплят опытной группы было затрачено 0,855 кг препарата **Клим** на сумму 620 руб.

При содержании цыплят в клетках также наблюдали положительное влияние кормовой добавки **Клим**: сохранность цыплят в опытной группе по сравнению с контролем была выше на 1,7%, среднесуточный прирост живой массы — на 2,5 г, средняя живая масса бройлера в 40 дней — на 105 г, конверсия корма лучше на 0,06, санитарный забой меньше на 125 голов, европейский бройлерный индекс больше на 26 ед. (табл. 2). Препарата **Клим** в опытной группе израсходовано в количестве 2,02 кг на сумму 1466 руб.

Окупаемость вложений в кормовую добавку **Клим** в опытах на цыплятах-бройлерах при содержании их на

Таблица 1. Результаты опыта при содержании птицы на полу

Показатель	Группа	
	контрольная	опытная
Поголовье в начале опыта	790	790
Живая масса бройлера в конце опыта, г	1849	2082
Сохранность, %	96,2	95,3
Среднесуточный прирост, г	43,2	48,0
Конверсия корма	2,02	1,88
Единый бройлерный индекс, ед.	206	243


Таблица 2. Результаты опыта при содержании птицы в клетках

Показатель	Группа	
	контрольная	опытная
Поголовье в начале опыта	1820	1820
Живая масса бройлера в конце опыта, г	2047	2150
Сохранность, %	94,4	96,1
Среднесуточный прирост, г	48,2	50,7
Конверсия корма	1,88	1,82
Санитарный забой, голов	178	53
Единый бройлерный индекс, ед.	242	268

полу составила 11 руб. на 1 руб. затрат; при содержании в клетках — 16,5 руб.

Результаты наших исследований показали, что ввод 300 г кормовой добавки **Клим** на 1 т комбикорма эффективно воздействует на рост и развитие цыплят-бройлеров при их содержании как на полу, так и в клетках.

СОРТИРОВКИ
гранулированного комбикорма



C-600
C-1000
C-1250
C-1500
C-2000

ОАО «НИИпроектасбест»
Свердловская область, г. Асбест, т.: (34365) 74003, 43267
E-mail: pko@niiasbest.ru