

ПРЕСТАРТЕРНЫЙ КОРМ В ПЕРИОД ОТЪЕМА ПОРОСЯТ

Х. ХОНДЕРД, главный технолог по свиноводству ООО «Коудайс МКорма»

Использование в кормлении поросят в подсосный и послеотъемный периоды высокоэнергетических легкоусвояемых кормов, способствующих оптимальному развитию пищеварительной системы поросенка, позволяет получить дополнительный прирост на доращивании и откорме.

Престартер не может заменить поросётам молоко свиноматки

Неважно, насколько хорош по питательности престартерный корм, он никогда не сможет заменить молоко свиноматки.

На рисунке 1 представлены результаты эксперимента по изучению влияния на молокоотдачу различных факторов. Так, при повышении температуры окружающей среды снижается потребление корма свиноматками, следовательно, и выработка ими молока. В свою очередь это приводит к снижению живой массы поросят к моменту отъема. Таким образом, при снижении выработки молока свиноматкой поросята не смогут компенсировать его недостаток, потребляя большее количество престартера.




Рис. 1. Влияние повышения температуры на выработку молока свиноматкой

Давайте престартер поросятам небольшими порциями

Престартер не может составить конкуренцию молоку свиноматки, но с помощью некоторых приемов вы сможете заставить поросят потреблять корм в большем количестве:

- с третьего дня после рождения ежедневно наливайте им молоко в круглые кормушки (рис. 2);
- устанавливайте кормушку рядом с головой свиноматки;
- наполняйте кормушку молоком дважды в день (во время кормления свиноматок);
- не перекармливайте поросят. Они должны опустошать кормушку перед следующим кормлением;
- с шестого дня после рождения поверх молока добавляйте понемногу супер-престартер;

- с каждым днем увеличивайте количество престартерного корма;
- с десятого дня после рождения прекратите давать молоко поросятам, а скармливайте только супер-престартер, при этом используйте одну и ту же кормушку;
- постоянно обеспечивайте поросят свежей питьевой водой.

Всегда используйте свежий корм

Чтобы престартерный корм был более привлекательным для поросят, в его состав вводят ароматизаторы и подсластители. Однако уже через несколько часов запах корма в кормушке становится менее выраженным, а гранулы более жесткими; ухудшается вкус. В связи с этим рекомендуется давать корм небольшими порциями не менее двух раз в день. При этом кормушка должна быть пустой перед следующим кормлением. Если в ней остался несъеденный корм, его можно скормить свиноматке. Необходимо следить за тем, чтобы тара или мешок с кормом были всегда закрыты, иначе его запах и вкус ухудшатся.

Не меняйте состав корма во время отъема

Всасывание питательных веществ переваренного корма и перенос их в кровь осуществляют ворсинки на стенке тонкого отдела кишечника. Они становятся короче и работают менее эффективно, когда поросята подвергаются стрессу при отъеме и других манипуляциях (рисунки 3 и 4).



Рис. 2. Круглая кормушка для поросят в боксах опороса



Рис. 3. Нормальные ворсинки после отъема




Рис. 4. Поврежденные ворсинки после отъема

Чем ниже потребление корма в первый день после отъема, тем больше повреждаются ворсинки, и тем больше времени проходит до их 100%-ного восстановления.

На рисунке 5 представлен график зависимости длины ворсинок кишечника от потребления корма поросятами до и после отъема. В день отъема поросята ворсинки кишечника находятся в нормальном состоянии. В момент отъема и после него длина ворсинок составляет всего лишь 50% от первоначальной длины, и ворсинки перестают функционировать должным образом. У поросят, потреблявших престартер до отъема в большем количестве, длина ворсинок восстанавливается через три дня после отъема и почти соответствует норме. При низком потреблении корма длина ворсинок у поросят на третий день после отъема составляет лишь 60% от нормы. У таких поросят возможен риск проявления послеотъемной диареи.




Рис. 5. Длина ворсинок кишечника в зависимости от потребления корма поросятами до и после отъема

Чтобы поросята начали потреблять корм сразу после отъема, рекомендуется в течение первых трех дней скормливать им тот же корм. Поэтому переходить от суперпрестартера к престартеру необходимо на четвертый день после отъема либо за семь дней до отъема.

Зоотехнические параметры во время отъема

При отъеме важно не только обеспечивать поросят качественными комбикормами, но и соблюдать нормы по зоотехническим параметрам.

Температура. После отъема большинство поросят не потребляют корм в течение нескольких часов и нуждаются в более высокой температуре окружающей среды. В первый день она должна составлять 26°C на расстоянии 20 см над полом, то есть на уровне поросят. В это время не следует смотреть на термометр, следите за поросятами. Если они лежат, плотно прижавшись друг к другу, значит температура слишком низкая (рис. 6). В таком случае они либо вовсе не станут потреблять корм, либо будут потреблять его меньше обычного.

Вода. Если поросята не будут пить воду, они не будут поедать корм, поэтому важно обеспечивать их свежей

Рис. 6. Поведение поросят при низкой температуре окружающей среды



водой. Для этого необходимо: промыть трубы, по которым подается вода, и nippleные поилки перед переводом поросят в цех дорастивания; установить достаточное количество поилок на соответствующей высоте (как минимум одну на 10 поросят). Не стоит добавлять медикаменты в воду в течение первых трех дней после отъема.

Дополнительные круглые кормушки. Перед отъемом поросята привыкают питаться вместе. В большинстве станков только от двух до четырех поросят могут есть одновременно. Поэтому необходимо установить в станке дополнительную круглую кормушку (рис. 7) так, чтобы могли кормиться одновременно не менее 10 поросят. Это способствует лучшему поеданию корма.

Освещенность. В первые часы после отъема поросята ведут борьбу за статус в новой группе. Спустя некоторое время они захотят есть, но не знают, где в новом помещении цеха отъема находятся корм и вода. Поэтому важно в течение первых 48 ч после отъема обеспечить непрерывное освещение бокса, чтобы поросята могли найти корм.

Таким образом, высококачественный престартерный корм, правильная организация содержания поросят помогут экономично вырастить свинью и снизить себестоимость свинины. ■



Рис. 7. Дополнительная кормушка для первых трех дней после отъема

142791, г. Москва,
с/п Воскресенское, а/я 62
Тел./факс +7 (495) 645-21-59, 651-85-20
e-mail: info@kmkorma.ru
www.kmkorma.ru

**КОУДАЙС
М КОРМА**